

Ciboria batschiana. (Zopf) Buchwald

Habitat

Un petit groupe poussant sur un gland dans la forêt de la Serre près de Dôle (39) sur sol acide et sous des chênes mélangés. Sortie du mercredi 28 octobre 2009.



Description macroscopique :

7 exemplaires, en disques stipités, groupés sur un gland pourrissant. **Hyménium** de 5-9 mm, formé d'un disque donc de forme générale assez plate mais qui, dans le détail, révèle quelques déformations plus ou moins subtiles comme l'ambitus légèrement affaissé ou au contraire relevé par endroits, le centre souvent légèrement déprimé, voire quelques fois des plis ou vaguelettes en surface, surface finement granuleuse, brune (vers Séguy 694) avec le centre plus foncé. **Marge** ronde ou légèrement déformée, parfois finement incisée, révélant à la loupe un petit filet brun. **Surface externe de l'apothécie** concolore un peu plus pâle que l'ambitus, finement granuleux. **Stipe** bien développé pouvant atteindre 20 x 1,5 mm sur la récolte, d'un brun beaucoup plus foncé que le reste, presque brun noirâtre à noirâtre dans la partie inférieure, un peu sillonné. **Chair brune**, un peu plus pâle dans l'âme du stipe à la jonction avec le chapeau.

Description microscopique :

Asques (A) : 130-170x6,5-8 µm, octosporés et unisériés, plutôt aporhinqes bien que certaines soient à la limite.

Paraphyses (B) : 1-3 µm de largeur, très fines et un peu épaissies au sommet, non septées.

Spores (C) : 7,5-10x 4,5-5,5 µm, grossièrement ellipsoïdales, guttulées, pouvant « germer ».

Articles de l'excipulum (D) : globuleux et de taille très variable, parfois un peu allongés dans la partie externe.