



Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Amanita praecox* Y. Lamoureux nom. prov. Y. Lamoureux nom. prov.

Nom Français : Amanite précoce

Taxon : IUMQ0065

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Agaricales

Sous-ordre : Pluteineae

Famille : Amanitaceae

Genre : Amanita

Sous-genre : Incertain

Section : Amanita

Chapeau

2-7 cm de diam., globuleux à convexe puis étalé, nu à orné de quelques flocons vélaires blancs sur fond beige à jaune ocré, souvent brun jaunâtre au centre, parfois blanchâtre vers le pourtour, à marge sillonnée

Lames

Libres, adnexées à uncinées, 4-5 mm de largeur, avec lamellules (sub)tronquées à atténuées, de diverses longueurs et uniformément distribuées, serrées, blanchâtres

Pied

5-15 x 0,5-1,5 cm, (sub)bulbeux-arrondi, parfois avec un rebord membraneux, glabre à finement fibrilleux, blanc, non annelé

Voile général



Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

Friable, blanc, laissant souvent de petits flocons sur le chapeau et parfois un rebord membraneux sur le bulbe du pied

Voile partiel

Absent

Chair

Blanche

Odeur et saveur

Odeur indistincte

Sporée

Blanche

Basides

Non à peu souvent bouclées à la base

Spoires

(sub)globuleuses, parfois largement ellipsoïdes, rarement ellipsoïdes, lisses, inactives dans le Melzer, 8-9 x 7,5-8,2 µm

Écologie

Mycorhizien :

sur sol sous conifères, épinettes, pins, pruches, sapins

Période

Mi-juin à octobre

Fréquence



Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

Très commune

Comestibilité

Inconnue

Remarques

Cette amanite se caractérise par son chapeau jaune ocré, nu ou orné de quelques flocons isolés blancs, à marge sillonnée, son pied non annelé et sa croissance sous conifères.

Le voile général laisse souvent un faux-anneau sur le pied ainsi que des restes à la base du pied. Il n'y a pas de voile partiel. Les basidiomes qui poussent en septembre peuvent être nettement plus robustes.

A. russuloides, sosie presque parfait, se distingue par la présence d'un anneau véritable, ample ou apprimé sur le pied, et sa croissance sur sol sablonneux, uniquement sous peupliers.

A. praecox et *A. russuloides* ont longtemps été confondues avec l'Amanite jonquille (*A. gemmata* [Fr.] Bertillon), espèce européenne.

Exposé aux rayons du soleil ou aux fortes pluies, le chapeau de l'Amanite précoce peut pâlir de façon notable, comme chez la majorité des amanites.

Références

Lamoureux, Y. (2006). Champignons du Québec, Tome 2 Les Amanites. Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal.

Yves Lamoureux : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

PHOTOS MACROS



© Margot et Herman 2011

© Herman Lambert



© Cimon 2010

© Jules Cimon



Y12781
© Photo : Yves Lamoureux
Centre des mycologistes de Montréal

cm

© Yves Lamoureux



© Hervé Audet



© CMAQ
Jules Cimon

1 cm

© Jules Cimon



03110 2014
© J. Labrecque

© Jacqueline Labrecque



© Marc Olivier Labrecque



Marc Bois

© Marc Bois



2012
02478

© J. Labrecque

© Jacqueline Labrecque


PHOTOS MACROS



© Herman Lambert



© Dany Vallières



© Jules Cimon



© Renée Lebeuf



© Jules Cimon



© Jacqueline Labrecque



© Renée Lebeuf



© J-Marc Giroux



© Jules Cimon

Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

PHOTOS MACROS



© Renée Lebeuf



© Raymond McNeil



© Gaétan Lefebvre




© Pauline Dubé



© Jacqueline Labrecque



© Jules Cimon



© Herman Lambert



© Jacqueline Labrecque



© Joseph Nuzzolese

PHOTOS MACROS




© *Gwenael Cartier*


Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.


PLANCHES MICROSCOPIQUES




© Guy Fortin



© Guy Fortin




© Guy Fortin



© Guy Fortin



© Guy Fortin



© Guy Fortin

ANNEXE : TABLEAUX COMPARATIFS

Tableau différentiel entre <i>Amanita praecox</i> et <i>Amanita russuloides</i>		
Caractères distinctifs	<i>Amanita praecox</i>	<i>Amanita russuloides</i>
Voile partiel :	absent faux anneau laissé parfois sur le pied par les restes du voile général	distinct véritable anneau laissé sur le pied
Spores :	globuleuses 8-9 x 7,5-8,2 µm	ellipsoïdes 9,5-11,5 x 6-8,2 µm
Habitat :	sur sol sous conifères	sur sol sous peupliers / bouleaux
Période d'apparition :	précoce / mi-juin	plus tardive / juillet
Roland Labbé : octobre 2011.		

© Roland Labbé



Amanita praecox

Y. Lamoureux nom. prov.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (1)

[Clé des espèces de la section Muscaria du genre Amanita du Québec](#)

Création : Roland Labbé, avril 2025.

Dernière mise-à-jour : 2025-04-26 13:07:32