



Craterellus fallax

A.H. Sm.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Craterellus fallax* A.H. Sm.

Nom Français : Fausse corne d'abondance (Trompette des morts)

Taxon : IUMQ0590

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Cantharellales

Sous-ordre : Incertain

Famille : Hydnaceae

Genre : *Craterellus*

Remarques

Traditionnellement, l'espèce américaine, *C. fallax* a été séparée de l'espèce européenne, *C. cornucopioides*, sur la base de leur distribution géographique et de la coloration de leur hyménophore, celui de *C. fallax* devenant saumoné par dépôt de spores.

René Pomerleau a longtemps hésité avant de choisir l'épithète *fallax*, sachant que tous les autres caractères étaient conformes à l'espèce européenne. Finalement, il a penché vers ce qualificatif croyant que la sporée saumonée serait suffisante pour créer une nouvelle espèce.

En 2000, une première étude génétique réalisée par Dahlman et coll. indiquait que l'espèce américaine correspondait bien à *C. cornucopioides* d'Europe. Cette proposition fut cependant démentie en 2010 par une étude plus poussée réalisée par Matheny et coll.

C. fallax passe facilement inaperçue en forêt à cause de sa coloration foncée. Les terrains en pente, sur sol calcaire et peuplés de hêtres, constituent les meilleures stations de recherche.

Une forme jaune et qui noircit existe. Elle correspond génétiquement à l'espèce type *C. fallax*.

C. caeruleofuscus diffère par son hyménophore plus ridé, son pied distinct, son odeur indistincte et sa

sporée blanche.

C. foetidus a des basidiomes charnus et un hyménophore distinctement plissé-ridé, parfois $\pm$ poroïde à maturité.

Chapeau

5-10 cm de hauteur, 2-8 cm de diam., profondément infundibuliforme, à face interne ruguleuse, orné de fibrilles ou de fines écailles fibrilleuses foncées sur fond brun grisâtre, brun noirâtre à noir, à marge enroulée puis arquée, ondulée et irrégulière

Hyménophore

Lisse à plissé-ridé, décurrent, gris bleuté à gris-brun puis jaunâtre, orangé à saumonée avec l'âge, devenant noirâtre au froissement

Pied

Indistinct, comme courte extension de l'hyménophore, souvent creux, brun foncé à noirâtre

Contexte

Très mince, fibreux à cassant, noirâtre

Odeur et saveur

Odeur aromatique, souvent fruitée, et saveur indistincte

Sporée

Jaunâtre, orangée à saumonée

Basides

clavées, à 2 stérigmates, parfois 3, non bouclées à la base, jusqu'à 60-70 μ m de longueur

Spores

Largement ellipsoïdes, lisses, à paroi mince, à contenu homogène, hyalines, inactives dans le Melzer,



Craterellus fallax

A.H. Sm.

(10)12-15 x (7)8-10 µm

Cystides hyméniales

Absentes

Pileipellis

Formé d'éléments cylindriques, septés, hyalins à brunâtres, 5-20 µm de diam.

Boucles

Absentes

Mode de croissance

Dispersé, grégaire ou souvent cespiteux

Écologie

Mycorhizien :

sur sol sous feuillus, surtout dans les vieilles hêtraies

Période

Mi-juillet à septembre

Fréquence

Occasionnelle

Comestibilité

Comestible de choix

Références

Matheny, P.B., E.A. Austin, J.M. Birkebak, & A.D. & Wolfenbarger, A.D. (2010) *Craterellus fallax*, a Black



Craterellus fallax

A.H. Sm.

Trumpet mushroom from eastern North America with a broad host range. Mycorrhiza.

Dahlman, M., E. Danell & J. W. Spatafora (2000) Molecular systematics of *Craterellus*: Cladistic analysis of nuclear LSU rDNA sequence data. Mycol. Res.

Bessette, A.E., Bessette, A.R. & Fischer, D.W. (1997). Mushrooms of Northeastern North America. Syracuse University Press.

Mille et un champignons du Québec, Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal, 2002.


Adaptation

Roland Labbé, mars 2026.


PHOTOS MACROS




© James Loiseau



© Renée Lebeuf



© Bruno Bergeron



© Fernand Therrien




© Raymond McNeil



© Fernand Therrien



© Jules Cimon



© Bruno Bergeron
Page 5/9



© Yves Lamoureux

PHOTOS MACROS



© Jacqueline Labrecque




© Jacqueline Labrecque



© Jacqueline Labrecque



© Jacqueline Labrecque



© Renée Lebeuf



© Raymond McNeil



© Herman Lambert



© Raymond McNeil
Page 6/9




© Fernand Therrien


PHOTOS MACROS




© Marc Bois



© Marc Olivier Labrecque



© James Loiseau



© James Loiseau

Craterellus fallax

A.H. Sm.

PLANCHES MICROSCOPIQUES



© Benoît Fortin



© Jacqueline Labrecque



Craterellus fallax

A.H. Sm.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (2)

[Clé des champignons cantharelloïdes au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2026-05-19 01:23:09

[Clé des espèces du genre *Craterellus* au Québec](#)

Dernière mise-à-jour : 2026-05-26 00:31:53