Crepidotus albatus

Hesler & A.H. Sm.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Crepidotus albatus* Hesler & A.H. Sm.

Nom Français : Crépidote blanc

Taxon : IUMQ0597

Taxonomie :

Division : Basidiomycota
Sous-division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycetes
Sous-classe : Incertain
Ordre : Agaricales
Sous-ordre : Agaricineae
Famille : Crepidotaceae
Genre : Crepidotus

Chapeau

(0,3)0,6-2 cm de diam., ongulé, vite semi-orbiculaire à flabelliforme, sec, villeux, pubescent à fibrilleux blanc, feutré-fibrilleux vers la marge, strigueux vers la base, blanc, à marge enroulée, givrée

Lames

Étroitement adnées, étroites à modérément larges, serrées, blanches puis cannelle rosâtre, cannelle à la fin, à arêtes entières à fimbriées

Pied

Absent

Chair

Mince, ferme, blanche à pâle

Odeur et saveur

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Odeur et saveur indistinctes

Basides

À 4 stérigmates, (18)25-30 x 6-8 µm

Spores

Ellipsoïdes vues de face, subinéquilatérales vues de profil, ponctuées, 6-8(9) x 4-5,5 µm

Cheilocystides

Lécythiformes avec col, souvent flexueuses, 31-70 x 6-12 µm

Pleurocystides

Lécythiformes, atténuées ou avec col, 24-46 x 5-8 µm

Trame lamellaire

Emmêlée :

formée d'hyphes de 5-10 µm de diam.

Piléitrame

Formée d'hyphes emmêlées, rapidement jaunes dans le KOH 2% sur les hyphes basales

Pileipellis

En cutis :

formé d'hyphes apprimées, portant des touffes emmêlées, hyalines, 2-3(5) µm de diam.

Boucles

Présentes

Écologie

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Crepidotus albatus

Hesler & A.H. Sm.

Saprotrophe :

sur bois mort de feuillus

Période

Juin à août

Comestibilité

Non comestible

Remarques

Ce crépidote se caractérise par ses petits basidiomes, son chapeau blanc, tomenteux, ses grandes cystides hyméniales lécythiformes à cucurbitiformes et ses spores ellipsoïdes ponctuées.

C. fusisporus, sosie, diffère par ses spores fusiformes.

C. fragilis a un chapeau plus grand, blanc, et des spores amygdaloïdes, lisses, légèrement plus longues.

Références

Hesler, L.R. & Smith, A.H. (1965). North American species of Crepidotus. University of Michigan Library.

Yves Lamoureux : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Crepidotus albatus

Hesler & A.H. Sm.

PHOTOS MACROS

© Yves Lamoureux

© Yves Lamoureux

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025