

*Crepidotus autochthonus* J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 4 (6) : 51 (1938)

Chapeau : 10-40 mm, semi-circulaire à flabelliforme, convexe à plan-convexe, attaché latéralement ou presque latéralement au substrat, à marge incurvée, puis même ondulée, surface sèche, glabre à finement fibrilleuse-tomenteuse, blanchâtre sale, crème à chamois jaunâtre.

Lamelles : blanchâtres chez les jeunes spécimens, puis tachetées de brunâtre et enfin uniformément brun cannelle à fauve, serrées, adnées marginalement, marge régulière.

Spores en masse : brun jaunâtre à terre d'ombre.

ellipsoïdes, amygdaliformes ou limoniformes en vue latérale, à apex plus ou moins aigu, lisses, à parois épaisses, parfois amincissantes à l'apex aigu, jaunâtres à brun jaunâtre dans le KOH, généralement avec une grosse goutte d'huile 7,0-9,0 × 5,0-6,0 µm

Basides : 25-30 × 7-9 µm, cylindro-claviformes, à 4 stérigmates. 17-32 × 7-13 µm, cylindriques, claviformes, certaines subcapitées, courtement lagéniformes, non ramifiées, rarement cloisonnées, à parois fines à épaisses.

Basidioles et chéilocystides, parfois à contenu jaune-doré et lisse (Fig. 11e).

Habitat : Grégaire ou en petits groupes au sol, dans une forêt de *Quercus frainetto* ou un mélange de *Q. frainetto* et d'*Abies borisii-regis*