



Crepidotus geophilus

(Murrill) Redhead

DESCRIPTION

Nom Latin : *Crepidotus geophilus* (Murrill) Redhead

Nom Français : Crépidote géophile

Taxon : IUMQ0610

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Agaricales

Sous-ordre : Agaricineae

Famille : Crepidotaceae

Genre : *Crepidotus*

Chapeau

0,5-1,5 cm de diam., ± résupiné, conchoïde, sec, glabre, lisse, blanc, mycélioïde à la base, à marge mince, entière à légèrement lobée, concolore

Lames

Modérément larges, espacées, blanches au frais, fragiles et brun jaunâtre au sec

Pied

Absent

Chair

Mince

Spores

Oblongues-ellipsoïdes, lisses, hyalines, 9-11 x 4-5 µm



Crepidotus geophilus

(Murrill) Redhead

Écologie

Saprotrophe :

sur sol au bord des routes forestières ou sur bois, surtout de feuillus, parfois sur bois carbonisé

Période

Automne

Comestibilité

Non comestible

Remarques

Ce crépidote se caractérise par son chapeau conchoïde, glabre, blanc, ses lames assez larges, espacées et ses grandes spores.

Références

Redhead, S.A. (1984). Sydowa 37: 255.

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Crepidotus geophilus

(Murrill) Redhead

PHOTOS MACROS



© Raymond McNeil