Crepidotus kauffmanii

Hesler & A.H. Sm.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Crepidotus kauffmanii* Hesler & A.H. Sm.

Nom Français : Crépidote de Kauffman

Taxon : IUMQ0611

Taxonomie :

Division : Basidiomycota
Sous-division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycetes
Sous-classe : Incertain
Ordre : Agaricales
Sous-ordre : Agaricineae
Famille : Crepidotaceae
Genre : Crepidotus

Chapeau

(0,6)1-3(5) cm de diam., flabelliforme à convexe, sec, densément orné de fibrilles apprimées à feutrées ou parfois de squamules brunes, fauve brunâtre, noisette à cannelle vineux sur fond chamois pâle, fauve à fauve olive, couvert de mycélium blanc au point d'attachement

Lames

Arrondies près de la marge piléique, larges, avec lamellules, serrées à très serrées, blanches puis brunâtres, chamois cannelle pâle à noisette

Pied

Absent

Chair

Mince, blanchâtre, beige à brunâtre

Odeur et saveur

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 15/09/2025

Odeur et saveur indistinctes

Sporée

Brun pâle à brun sayal

Basides

À 2-4 stérigmates, (20)25-33 x 6-7(8) µm

Spores

Ellipsoïdes à subovoïdes vues de face, obscurément inéquilatérales vues de profil, ponctuées, (5)5,5-7(8) x 4,5(5,5) µm

Cheilocystides

Clavées à ventrues, parfois cylindriques à filamenteuses, arrondies à plus rarement fourchues à l'apex, 30-50(80) x 5-11 µm

Pleurocystides

Absentes

Trame lamellaire

Subparallèle ou emmêlée :

formée d'hyphes de 5-8(12) µm de diam.

Piléitrame

Formée d'hyphes emmêlées

Pileipellis

En cutis :

formé d'hyphes apprimées, portant des touffes d'hyphes emmêlées, brunes et incrustées de 5-9 µm de

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 15/09/2025

diam., et hyalines de 3-5 µm de diam.

Boucles

Présentes

Écologie

Saprotrophe :

sur bois pourri de feuillus au sol ou branches mortes de tilleuls encore accrochées à l'arbre vivant

Période

Juillet à septembre

Fréquence

Très rare

Comestibilité

Non comestible

Remarques

Ce crépidote se caractérise aisément par son chapeau subtomenteux-fibrilleux, brun fauvâtre puis beige rosé.

Il a une couleur foncée pour un crépidote.

C. calolepis, aussi à chapeau méchuleux, diffère par la couche gélatinisée sous la cuticule piléique et ses spores de 7-9(10) x 4,5-5,5(6) µm.

Références

Hesler, L.R. & Smith, A.H. (1965). North American species of Crepidotus. University of Michigan Library.

Mille et un champignons du Québec, Cercle des mycologues de Montréal inc., Montréal, 2002.

Yves Lamoureux : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 15/09/2025

Crepidotus kauffmanii

Hesler & A.H. Sm.

PHOTOS MACROS

© Renée Lebeuf

© Renée Lebeuf

© Yves Lamoureux

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 15/09/2025