Crepidotus versutus

(Peck) Sacc.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Crepidotus versutus* (Peck) Sacc.

Nom Français : Crépidote opportuniste

Taxon : IUMQ0617

Taxonomie :

Division : Basidiomycota
Sous-division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycetes
Sous-classe : Incertain
Ordre : Agaricales
Sous-ordre : Agaricineae
Famille : Crepidotaceae
Genre : Crepidotus

Chapeau

0,5-1,4 cm de diam., résupiné puis réfléchi, attaché dorsalement à latéralement, dimidié à flabelliforme, sec, villeux à tomenteux, blanc, à marge incurvée, unie

Lames

Radiantes d'un point d'attachement excentré à latéral, modérément larges, ventrues, avec plusieurs lamellules, subespacées, blanches au début, teintées de rouille ou de brun cannelle à la fin, à arêtes fimbriées

Pied

Absent ou parfois comme court tubercule

Chair

Mince, molle, blanche

Odeur et saveur

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Odeur et saveur douces

Sporée

Brun cannelle

Subhyménium

Formé d'hyphes parallèles

Basides

À 4 stérigmates, 27-32 x 6-7 µm

Spores

Ellipsoïdes, très finement ponctuées, plus visibles dans le Melzer que dans le KOH, jaunâtres à brun jaunâtre, 7-11 x 4,5-6 µm

Cheilocystides

Dispersées à abondantes, cylindriques, subventrues à lagéniformes, 22-63 x 3-12 µm

Pleurocystides

Absentes

Trame lamellaire

Emmêlée ou parfois subparallèle :

formée d'hyphes de (2)4-7 µm de diam.

Pileipellis

En cutis :

formé d'hyphes emmêlées, portant des touffes d'hyphes longues, élancées, 2,5-5 µm de diam.

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Boucles

Absentes dans le suprapellis, présentes sur les hyphes du tomentum à la base du chapeau

Écologie

Saprotrophe :

sur écorces de feuillus

Période

Août à octobre

Comestibilité

Non comestible

Remarques

Ce crépidote se caractérise par son chapeau blanc, villeux à tomenteux, et ses assez grandes spores ellipsoïdes et ponctuées.

Il est assez peu récolté en Amérique du Nord.

Références

Hesler, L.R. & Smith, A.H. (1965). North American species of Crepidotus. University of Michigan Library.

Patrick Poitras : www.flickr.com

Adaptation

Roland Labbé, mai 2024.

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Crepidotus versutus

(Peck) Sacc.

PHOTOS MACROS

© Renée Lebeuf

© Patrick Poitras

© Renée Lebeuf

© Renée Lebeuf

© Joseph Nuzzolese

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec. Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025

Crepidotus versutus

(Peck) Sacc.

PLANCHES MICROSCOPIQUES



© Herman Lambert

Landry J., Labbé, R., Lambert H., Lebeuf, R., Lamoureux, Y. et coll. - Base de données de Mycoquébec.
Disponible en ligne à l'adresse : https://www.mycoquebec.org. Consulté le 20/09/2025