



Pseudocraterellus subundulatus

(Peck) Peck

DESCRIPTION

Nom Latin : *Pseudocraterellus subundulatus* (Peck) D.A. Reid

Nom Français : Craterelle ondulée

Taxon : IUMQ0595

Taxonomie :

Division : Basidiomycota

Sous-division : Agaricomycotina

Classe : Agaricomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Cantharellales

Sous-ordre : Incertain

Famille : Hydnaceae

Genre : *Craterellus*

Remarques

Cette craterelle se caractérise par sa petite taille, sa coloration dans les tons de brun-gris à gris-noir et sa croissance sous feuillus nobles.

C. olivaceus diffère par sa taille plus petite et sa teinte jaune olive.

C. calyculus diffère seulement de *C. subundulatus* par ses spores plus grandes, 10-11,5 x 7-8 µm.

Il se pourrait que ces deux espèces soient la même. Elles sont aussi connues sous *Pseudocraterellus sinuosus* dont les basidiomes et les spores ont des tailles très variables.

Chapeau

Jusqu'à 4 cm de hauteur, 0,5-2 cm de diam., étalé puis légèrement déprimé à subinfundibuliforme, non perforé, à face interne fibrilleuse-apprimée à légèrement floconneuse-squamuleuse, rarement fibrilleuse-dressée vers le centre et lisse vers la marge, humide, mate, presque cendrée, gris brunâtre à brun foncé au frais, isabelle, brun-gris à olive brunâtre pâle au sec, souvent blanchâtre à jaunâtre vers le pourtour, à marge relevée avec l'âge, ondulée, frisée et plissée, avec lobes parfois imbriqués

Pseudocraterellus subundulatus

(Peck) Peck

Hyménophore

Inégal, souvent légèrement veiné, parfois plissé à sillonné, surtout vers la marge piléique, décurrent, plus pâle que le chapeau, brun-gris, grisâtre à jaune grisâtre au frais, chamois cannelle, argilacé à ocre pâle terne au sec

Pied

1-4 cm x 1-4 mm, légèrement élargi vers l'apex, égal à la base, rarement ramifié, plein, lisse, brun-gris à noirâtre

Contexte

Mince, flexible, concolore au chapeau

Odeur et saveur

Odeur et saveur indistinctes

Système hyphal

Monomitique; hyphes génératrices ramifiées, non bouclées, à paroi mince, souvent distinctement étranglées aux septums, subhyalines, à segment individuel de 23,4-60 x 4-10,5 µm de diam.

Basides

clavées, jusqu'à 6 stérigmates, non bouclées à la base, jusqu'à 33,5-46,8 x 10 µm

Spores

Ovoïdes, largement ellipsoïdes à ellipsoïdes, parfois globuleuses, lisses, à paroi mince, avec petit apicule latéral, (sub)hyalines, inactives dans le Melzer, 6,5-8 x 4-6 µm

Cystides et gléocystides

Absentes

Boucles



Pseudocraterellus subundulatus

(Peck) Peck

absentes

Mode de croissance

Dispersé ou grégaire

Écologie

Mycorhizien :

sur sol moussu des forêts de feuillus nobles, en milieux humides et bord de sentiers

Période

Juillet à septembre

Fréquence

Rare

Comestibilité

Comestible

Références

Reid, D.A. (1962). *Pseudocraterellus subundulatus* (Peck) D.A. Reid. Persoonia.

Yves Lamoureux : [www.flickr.com](https://www.flickr.com/photos/yveslamoureux/)

Adaptation

Roland Labbé, mars 2026.

Pseudocraterellus subundulatus

(Peck) Peck


PHOTOS MACROS



© Fernand Therrien



© Yves Lamoureux



© Herman Lambert



© Herman Lambert



© Herman Lambert



© Yves Lamoureux



© Renée Lebeuf



© Fernand Therrien
Page 4/6



Pseudocraterellus subundulatus

(Peck) Peck

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (2)

[Clé des champignons cantharelloïdes au Québec](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2026-05-19 01:23:09

[Clé des espèces du genre *Craterellus* au Québec](#)

Dernière mise-à-jour : 2026-05-26 00:31:53