



Trichoglossum variable

(E.J. Durand) Nannf.

DESCRIPTION

Nom Latin : *Trichoglossum variable* (E.J. Durand) Nannf.

Nom Français : Trichoglosse variable

Taxon : IUMQ3177

Taxonomie :

Division : Ascomycota

Sous-division : Pezizomycotina

Classe : Geoglossomycetes

Sous-classe : Incertain

Ordre : Geoglossales

Sous-ordre : Incertain

Famille : Geoglossaceae

Genre : *Trichoglossum*

Remarques

Cette espèce est apparemment identique à *T. hirsutum*, sauf pour les spores avec septums en nombre variable, entre 9-14, et non atténuées aux deux bouts.

Ascome

1,3-1,4 cm de longueur, formé d'un capitule fertile et d'un pied distincts, noir à noir brunâtre

Hyménophore

lisse, sur toute la surface externe du capitule

Capitule

3,5-5 de hauteur, 2-3 mm de diam., allongé, souvent étroit, parfois presque cylindrique, légèrement aplati à irrégulier, finement velouté, mat

Pied

Trichoglossum variable

(E.J. Durand) Nannf.

0,5-0,8 mm de diam., long, cylindrique, fin, légèrement élargi à atténué vers la base, plein, velouté, parfois légèrement strié à ridé

Chair

mince, homogène, coriace à cartilagineuse, noire.

Odeur et saveur

odeur et saveur indistinctes

Sporée

Brun foncé (trace, difficile)

Trame hyménophorale

en textura intricata :

formée d'hyphes emmêlées, irrégulières, modérément gélatinisées, septées, à paroi mince, lisses, hyalines, 2-4 µm de diam.

Asques

Cylindriques-clavés, à paroi mince, hyalins, à 8 spores en faisceau parallèle, inoperculés, avec crochet basal et appareil apical amyloïde, 195-245 x 19-23 µm

Paraphyses

fusiformes, élancées, flexueuses, robustes, multiseptées, souvent à 7-15 septums, à paroi mince, lisses, brunâtres à brun noirâtre à maturité, 60-100 x 4-6 µm, souvent courbes, lobées, spiralées et jusqu'à 6,3-12,6 µm de diam. à l'apex, ne dépassant pas les asques ou à peine:

Soies

De deux types :

a) soies hyméniales irrégulières de profil, aiguës, parfois flexueuses et bulbeuses à la base, avec quelques septums, brun marron à noirâtres, 160-180 µm de longueur

b) soies caulinaires semblables, formant des touffes ensemble avec les poils

Spores

Cylindriques, aciculées, flexueuses, souvent à 9-14 septums à maturité, aussi à 4-16 septums, à paroi mince, lisses, brunâtres, 80-150 x 4,5-6,5 µm

Excipulum

De deux types :

a) endexcipulum en textura intricata dans le capitule, en textura porrecta dans le pied, formé d'hyphes, septées, à paroi mince, lisses, hyalines, 2-5(6,3) µm de diam.

b) ectexcipulum caulinaire en textura intricata, formé d'hyphes emmêlés, septées, à paroi mince, lisses, hyalines, 2-5 µm de diam., traversé par les soies

Écologie

Saprotrophe :

sur sol marécageux

Fréquence

Rare

Comestibilité

Non comestible

Références

Renée Lebeuf : [www.flickr.com](https://www.flickr.com/photos/lebeuf/10000000000000000000/)


Adaptation

Roland Labbé, mars 2026.

Trichoglossum variable


(E.J. Durand) Nannf.

PHOTOS MACROS



© Renée Lebeuf

PLANCHES MICROSCOPIQUES



© Renée Lebeuf



Trichoglossum variable

(E.J. Durand) Nannf.

CLÉS D'IDENTIFICATIONS (1)

[Clé d'espèces sélectionnées du genre *Trichoglossum*](#)

Auteur : Roland Labbé, janvier 2022.

Dernière mise-à-jour : 2026-05-26 00:36:38